

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.

C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Bulletin n°19 d'avril 1962

6 avril 1962

CULTURES FRUITIERES

AVERTISSEMENT

Tavelure du poirier

Des pluies intervenant sur des arbres ayant atteint le stade C3 sont susceptibles de provoquer des contaminations. Appliquer un traitement cuprique avant que les arbres aient atteint ce stade.

INFORMATIONS

Anthonome du pommier

Dans les vergers où des dégâts ont été constatés les années dernières, effectuer un traitement sur les arbres ayant atteint le stade BI. A partir du stade C2 les pommiers ne sont plus sensibles aux attaques de l'anthonome.

Oïdium du pommier

L'oïdium du pommier est une grave maladie de cet arbre fruitier, il est fréquent dans la Circonscription de REIMS où il cause de sérieux dégâts dans les vergers.

Le champignon parasite hiverne sur les rameaux et dans les écailles des bourgeons contaminés l'année précédente. Lors de la taille, il convient donc d'éliminer soigneusement les rameaux présentant des attaques et de les détruire.

Dès le départ de la végétation, la contamination des jeunes organes verts peut se produire; aussi il importe d'effectuer des traitements précoces avant la floraison, car actuellement, les produits de lutte contre l'oïdium sont tous à action préventive.

DLP 29-3-63 201496

P13.4

Les arboriculteurs doivent, d'une part utiliser une quantité importante de liquide pour mouiller le plus possible la surface du végétal afin de favoriser la pénétration du produit et d'autre part, ajouter un mouillant à la bouillie.

Ces traitements sont continués après la floraison afin de limiter les foyers d'oïdium avant la sporulation d'été de ce champignon.

Les produits à utiliser sont indiqués sur la liste des produits conseillés en 1962 par les Stations d'Avertissements Agricoles, liste qui a été adressée à tous les abonnés.

GRANDE CULTURE

Gros charançon de la tige du colza

Ce parasite est très rare dans les cultures et il n'y a pas lieu d'intervenir.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles -

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique de REIMS -